

• PAS (Periodic Acid Schiff) - selon Pearse Haute affinité avec les groupes glycoliques et aminohydroxyliques, recommandé pour l'hypophyse. Contre coloration avec l'hématoxyline de MAYER et solution d'acide périodique.	Unité	F/010233
• PERLS - (Pour 10 techniques) Permet la détection du fer ferrique.	Unité	F/010236
• PERLS van Gieson - (Pour 10 techniques) Permet la détection du fer ferrique et la mise en évidence du collagène et du tissu conjonctif.	Unité	F/010237
• P.T.A.H (voir kit Hématoxyline acide phosphotungstique) .		
R		
• Réticuline (voir kit Imprégnation Argentique) .		
• Rhodamine Coloration permettant la mise en évidence du cuivre sur coupes de tissu hépatique.	Unité	F/010248
• Rouge Congo Mise en évidence des substances amyloïdes, à observer en lumière polarisée (biréfringence de ces substances)	Unité	F/010214
• Rouge Sirius Mise en évidence du collagène de type I et de la réticuline (collagène type III)	Unité	F/010254
T		
• Trichrome d'Azan selon Heidenhain Coloration topographique permettant de visualiser sur une même coupe : les fibres musculaires, le collagène, la réticuline, la structure du glomérule rénal, les érythrocytes et la chromatine nucléaire. (Attention : Amine aromatique. A manipuler avec précaution).	Unité	F/010212
• Trichrome de Dane selon Ackermann Permet la mise en évidence des mucines acides, de la kératine et des érythrocytes.	Unité	F/010215
• Trichrome de Gomori Coloration rapide pour la mise en évidence du muscle, du tissu conjonctif et de la myéline. Pour coupes congélées.	Unité	F/010302
• Trichrome de Mallory Coloration du tissu conjonctif en particulier : collagène, microfibres réticulaires, cartilage, tissu osseux, substances amyloïdes et noyaux.	Unité	F/010227
• Trichrome de Masson (bleu aniline) Recommandé pour la mise en évidence du tissu conjonctif. Marquage des gamètes, neurofibrilles, névroglie, collagène, kératine, fibrilles intracellulaires, noyaux et image négative de l'appareil de GOLGI.	Unité 6 x 1 L	F/010210 F/010210/L
• Trichrome de Masson selon Goldner (vert lumière) Recommandé pour la mise en évidence du tissu conjonctif. Marquage des gamètes, neurofibrilles, névroglie, collagène, kératine, fibrilles intracellulaires, noyaux et image négative de l'appareil de GOLGI.	Unité 6 x 1 L	F/010224 F/010224/L
• Trichrome de Picro Mallory selon Lendrum Coloration topographique permettant de visualiser les différents composants du tissu conjonctif.	Unité	F/010238
• Trichrome de Van Gieson selon WEIGERT Mise en évidence des fibres de collagène dans le tissu conjonctif.	Unité 6 x 1 L	F/010240 F/010240/L
• TWORT Coloration de GRAM pour coupes histologiques. Solutions de rouge neutre et vert rapide.	Unité	F/010310